

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Publication périodique

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

EDITION GRANDES CULTURES

ABONNEMENT ANNUEL: 80 f

REGISSEUR RECETTES D.D.A. CCP LYON 9431-17A



Circonscription RHONE-ALPES

55, rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 3

7 décembre 1984

N° de série continue 47

Bulletin n° 18

LUTTE CONTRE LES LARVES DE GROSSES ALTISES :

La méthode de lutte la plus efficace vis à vis des grosses altises est l'application d'un insecticide à l'automne contre les adultes.

Cependant, dans certains cas une intervention de rattrapage peut être nécessaire contre les larves.

Un traitement est nécessaire si plus de 70 % des pieds de colza sont attaqués par une ou plusieurs larves d'altise

Pour vérifier si ce seuil est atteint, il faut décortiquer les tiges des feuilles et constater si elles sont creusées de galeries. Cette opération est à répéter sur 25 à 50 plantes en divers endroits de la parcelle.

Si le seuil n'est pas atteint il est conseillé de faire une nouvelle observation un mois plus tard.

Si on observe des petites larves seulement à partir du mois de février il n'est pas utile d'intervenir car les dégâts ne peuvent plus être préjudiciables au rendement.

L'efficacité du traitement est améliorée si il est réalisé sur un feuillage sec par une journée ensoleillée (température minimale : 5°C)

PRODUITS UTILISABLES :

Oléoparathion méthyl à 350 g de matière active/ha
 Oléoparathion éthyl à 300 g de matière active/ha
 Parathion méthyl microencapsulé (PENNCAP M à 0,8 l de produit commercial/ha)
 Parathion méthyl + Phosalone (TAXYLONE à 1,5 l de produit commercial/ha)

Ne pas mélanger un Oléoparathion et un herbicide (respecter un délai de 3 semaines entre ces 2 applications). Le mélange TAXYLONE - LEGURAME PM est toutefois possible.

P107